

DRAPEAUX ROUGES

SÉLECTIVITÉ ALIMENTAIRE

QUAND CONSULTER EN ERGOTHÉRAPIE ?

0-2 ANS

Est-ce que votre enfant:

- Continue de présenter des réactions de nausées (ou de haut-le-cœur) après quelques expositions d'un nouvel aliment ?
- Accepte seulement les purées lisses après l'âge de 9 mois ?
- Semble n'avoir d'intérêt que pour le lait après l'âge de 9 mois ?
- Reste passif lorsque la nourriture est dans sa bouche ?
- A de la difficulté à faire des mouvements avec sa langue ou sa mâchoire lorsqu'il mange ?
- Reste avec de la nourriture présente sur les côtés de la bouche (à l'intérieur, près des joues) après avoir avalé la bouchée ?
- A des difficultés à manger des aliments de toutes les textures, ou les textures mixtes, après l'âge de 12 mois ?
- Présente des réactions de dégoût, est dérangé, lorsqu'il touche les aliments avec ses doigts ?
- A de la difficulté à rester assis correctement dans la chaise haute (manque de tonus) et/ou à saisir les aliments avec ses doigts ou un ustensile, en fonction de son âge ?
- Prend plus de 40 minutes pour compléter son repas ?
- Présente un ralentissement dans le gain de poids ou de croissance ?

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS DE CES QUESTIONS,

une consultation en ergothérapie pourrait répondre à vos besoins. Un appel téléphonique avec un ergothérapeute est proposé afin de discuter plus amplement de vos observations et d'une éventuelle consultation en ergothérapie.

EST-CE QUE VOTRE ENFANT :

- Tousse (ou à la voix rauque) de manière fréquente lorsqu'il s'alimente ?
- S'étouffe régulièrement avec un aliment dans la bouche ?
- Vomit lorsqu'il mange certains aliments ?
- Est souvent congestionné et/ou a déjà eu une pneumonie, une bronchiolite (et autres maladies respiratoires) ?

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS DE CES QUESTIONS,

il serait important d'en informer votre médecin en plus de poursuivre la démarche de consultation en ergothérapie. Un appel téléphonique avec un ergothérapeute est proposé afin de discuter plus amplement de vos observations et d'une éventuelle consultation en ergothérapie.